

Pressmeddelande

Från Skaraborgs Sjukhus

2009-08-10 16:00

Hudkliniken på SkaS manar till avlusning

Förebygg spridning av löss inför terminsstarten – varför invänta lusepidemin när man kan "mota Olle i grind"

Efter skolornas terminsstart brukar lusepidemierna ta fart. Nu är det hög tid att gå igenom håret på familjemedlemmarna för att upptäcka eventuella löss och åtgärda problemet innan skolstart.

Huvudlusen lever av blod och inte av smuts. Att huvudlöss skulle vara tecken på dålig hygien har varit en vanligt förekommande missuppfattning. Smittan sker framför allt genom kontakt mellan huvuden, sällan via mössor och hårborstar.

– Ingen är immun mot löss, påminner Lill-Marie Persson som är verksamhetschef på Hudkliniken. Alla kan drabbas! Finkamma håret och använd förstöringsglas för att fastställa diagnosen och senare för att se om en eventuell behandling haft effekt. Den levande lusen är upp till 3 mm lång och kan därför ses även utan förstöringsglas. Lusens ägg sitter fast på hårstråna nära hårbotten och följer sedan med utväxten.

– Vi vill verkligen uppmana alla föräldrar att undersöka familjens hår och behandla ev. löss inför terminsstarten, säger Lill-Marie Persson. På det sättet kan vi "mota Olle i grind" och förhindra lusepidemier.

Om man fastställt att någon i familjen har löss, ska endast den eller de som är drabbade behandlas så fort som möjligt och samtidigt. Behandlingen upprepas efter 1 vecka. Övriga familjemedlemmar och andra nära kontakter bör finkamma sina hår under 14 dagar för att kontrollera att de inte är drabbade.

För att behandla löss kan olika lusmedel som finns att köpa på Apoteket användas. De senaste åren har det funnits misstanke om att lössen blivit resistent mot rekommenderade lusmedel. Där misstanke om resistens förelegat har Smittskyddsinstitutet initierat resistensundersökningar och kunnat konstatera att resistens förekommer. De medel som nu rekommenderas är Hedrin, som finns på Apoteket eller Nyda, som säljs på Familjeapoteket. Båda innehåller silikonolja, som dödar lössen effektivt utan att påverka människan negativt. Risken för resistens är minimal.

– Om man upptäcker att någon i familjen har löss måste man kontaktpåra och informera i sin omgivning. Enbart de med levande löss behandlas. Behandlingen skall ske enligt bipacksedeln, som medföljer lusmedlet och upprepas efter 1 vecka. Behandlingseffekten skall alltid följas upp, sammanfattar Lill-Marie Persson.

Kontaktperson: Lill-Marie Persson, tel 0500-432111

Publicerad av: Maria Salomonsson Epost: maria.k.salomonsson@vgregion.se